

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE D'ANTHIA DE L'OUGANDA  
[COL. CARABIDÆ],

PAR M. G. BÉNARD.

*Anthia* (*Thermophila*) *Ertliana* nov. sp. (Kolbe in Coll.) <sup>(1)</sup>.

♂ Espèce d'un noir très brillant, de petite taille, de forme élégante et peu convexe s'élargissant très légèrement à partir du milieu des élytres et atteignant environ 27 millimètres de longueur.

Tête plus longue que large, déprimée entre les yeux, à surface médiane en forme de T, légèrement surélevée, presque lisse, brillante, offrant seulement dans la région longitudinale quelques gros points profonds et irrégulièrement disposés. Cette sculpture est limitée antérieurement par la base du labre et postérieurement par deux petites carènes partant du niveau des yeux, disposées obliquement, et convergeant vers le vertex. Yeux proéminents, tempes très légèrement renflées et grossièrement ponctuées. Col présentant une petite surface lisse au milieu et de chaque côté densément ponctué. Labre brillant, très convexe, présentant à la base une large dépression transversale, légèrement cintré en avant, à son bord antérieur, et de chaque côté, échaneré en angle droit; en arrière de cet angle, l'on remarque une forte impression. Mandibules courtes, fortes et arquées.

Pronotum très cordiforme, à gouttière latérale étroite mais très accentuée; à sillon médian large, très marqué, n'atteignant ni la base ni le sommet et fortement impressionné à chaque extrémité; surface presque plane, garnie de gros pores pilifères disposés très irrégulièrement et donnant naissance à de longues et fortes soies de coloration brun de poix.



Fig.1. — *Anthia* (*Thermophila*) *Ertliana* n. sp.

<sup>(1)</sup> Cette espèce répandue dans les collections sous le nom de *Anthia* (*Thermophila*) *Ertliana* Kolbe, nom que je lui ai conservé, n'a jamais été décrite, du moins à notre connaissance.

Écusson en triangle équilatéral, lisse et très brillant.

Élytres peu convexes, à déclivité peu accentuée vers le sommet; à stries profondes, semées de gros points régulièrement espacés; intervalles larges, costiformes, garnis de pores pilifères offrant de fortes soies et alignés longitudinalement de chaque côté, le long de leur base; les soies des intervalles impairs sont de coloration brun de poix celles des intervalles pairs sont d'un beige grisâtre.

Chaque élytre est orné à l'angle huméral de deux petites taches allongées et parallèles formées de soies d'un beige grisâtre et situées à la base des intervalles quatre et six, en comptant le sutural.

Pattes moyennes; les cuisses à surface lisse présentent une série de pores pilifères alignés longitudinalement; tibias très carénés et garnis de fortes épines; les tibias intermédiaires sont terminés par une touffe de fortes soies rougeâtres, située sur les côtés externes.

La ♀ présente les mêmes caractères que le ♂, toutefois les élytres sont plus élargis.

Par son facies général, cette espèce ressemble à *Anthia* (*Thermophila*) *bella* Obst; mais elle en diffère par la forme du labre qui chez *Thermophila Ertliana*, est, sur les côtés de son bord antérieur, échancré en angle droit; elle s'en éloigne également par les taches humérales au nombre de deux sur chaque élytre chez *Thermophila Ertliana* tandis qu'il n'y en a qu'une seule chez *Thermophila bella*.

Habitat : Ouganda; Afrique Orientale anglaise. (Muséum national d'Histoire naturelle de Paris).